



**ten Dijk**  
Schädlingsbekämpfung

## Fruchtfliege

Lateinisch: Drosophilidae  
Familie: Fruchtfliegen  
Orde: Zweiflügel  
Status: nicht geschützt



### Aussehen und Eigenschaften

Ein voll gewachsenen Fruchtfliege is ca. 3 mm gross und ist geldbraun oder gesprenkelt. Bei den meisten Arten sind die Augen rot.

### Entwicklung und Lebensweise

Fruchtfliegen durchlaufen eine vollständige Transformation (Ei-Larven-Pop-Bild). Die Entwicklung vom Ei zur erwachsenen Fruchtfliege dauert 8 bis 11 Tage und findet normalerweise in zerfallendem, fermentierendem Material statt. Das Weibchen legt 400 bis 900 Eier. Eier und Larven sind mit Vorsprüngen oder Atemschläuchen (zum Einatmen von Flüssigkeit) versehen. Eine Fruchtfliege lebt 2 bis 9 Wochen.

### Schutzmöglichkeit

Fruchtfliegen kommen häufig unter anderem in der Lebensmittelindustrie, in Küchen, im Catering (hinter dem Wasserhahn), aber auch in Tierfutterställen und Futterküchen vor.

### Abwehr

- Bewahren Sie Obst und Gemüse nicht unbedeckt und vorzugsweise nicht zu lange auf.
- Bewahren Sie Obst und Gemüse nicht unbedeckt und vorzugsweise nicht zu lange auf.
- Halten Sie die Bodenabläufe sauber und spülen Sie sie gründlich aus.

- Tierhaltung:
  - o Lassen Sie keine Speisereste im Stall.
  - o Ställe regelmäßig reinigen und reinigen.
  - o regelmäßig stricken (Futter) kochen.

**Wichtig:** Gute Hygiene muss immer an erster Stelle stehen. Bereiten Sie dafür einen Reinigungsplan vor.

**Bekämpfen:**

Entfernen Sie sofort die Quelle und reinigen Sie den Bereich anschließend gründlich. Bei Bedarf können Sie eine (lokale) chemische Kontrolle durch ten Dijk Schädlingsbekämpfung durchführen lassen.