

WIRKUNGSWEISE:

Der Wirkstoff Brodifacoum gehört zur Gruppe der Antikoagulantien. Er hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf und erzeugt innere Blutungen. Zur Abtötung der schädlichen Nager kann die einmalige Aufnahme einer ausreichenden Menge des TDS Brodifacoum Pasta 25 genügen. In der Regel tritt die Wirkung nach ca. 4-10 Tagen ein. Der Köder enthält einen Bitterstoff, der das Mittel für Menschen und Haustiere ungenießbar macht und so das Risiko einer versehentlichen Aufnahme verringert.

ANWENDERKATEGORIE:

Für geschulte berufsmäßige Verwender.

ANWENDUNG:

Vor der Beköderung der Nagetierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und das Ausmaß des Befalls abschätzen. Für Nager leicht erreichbare Nahrungsquellen und Tränken (z.B. verschüttetes Getreide, Nahrungsabfälle, etc.) möglichst entfernen. Das Produkt nur als Teil einer integrierten Schädlingsbekämpfung zusammen mit Hygienemaßnahmen und gegebenenfalls physikalischen Methoden der Schädlingskontrolle verwenden. Das Produkt sollte in der unmittelbaren Umgebung, in der Nagetiere zuvor beobachtet wurden, aufgestellt werden (z.B. Nagetierwege, Nistplätze, Fressnetze, Löcher, Baue, etc.). Köder vor Witterung (z.B. Schnee, Regen, etc.) schützen. Die Köder in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigt ist. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen die mehr als 35 Tage andauern. Köderstationen müssen verwendet werden. Nur in Bereichen (z.B. geschlossene Kabeltrassen oder Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltkreisläufen oder Hochspannungsschrank, Hohlräume in Wänden und Wandverkleidungen), die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationsichere Köderstationen zulässig. Der Köder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Köderstation entfernt werden kann. Das Produkt nicht zur Dauerbeköderung verwenden. Sachets mit dem Köder nicht öffnen. Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und fachgerecht entsorgen. Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende Maßnahmen ergreifen: Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen oder für Nager unzugänglich machen. Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe von Gebäuden möglichst entfernen. Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für Nagetiere unzugänglich machen oder verschließen.

Um Gebäude: Produkt nicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbauten oder -löcher) einbringen.

AUFWANDSMENGE:

Wanderratte: 100-200 g pro Köderpunkt im Abstand von 5 m;
Hausmaus: 20-40 g pro Köderpunkt im Abstand von 5 m anbieten.

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG:

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Die Verpackung verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nach Abschluss der Beköderung alle nicht angenommenen Köder und die Verpackung gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden.

Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflussbereiches erfolgt, übernehmen wir eine Haftung nur für einwandfreie Qualität am Tag der Lieferung.

TDS Brodifacoum Pasta 25

Gebrauchsfertiger Pastenköder zur sicheren Bekämpfung von Hausmäusen und Wanderratten im Innenbereich sowie im Außenbereich (um Gebäude)

Wirkstoff: 0,025 g/kg (0,0025%) Brodifacoum
mit Bitter- und Farbstoff
Biozid-Zulassungs-Nr.: DE-0020705-14
UFI: H520-U02H-A009-CSK9



ten Dijk
Schädlingsbekämpfung

ten Dijk Schädlingsbekämpfung GmbH • Friedhofsweg 3a • D-49843 Uelsen
Tel.: +49(0)5948/998 300 2 oder +31(0)571/291 376 • info@tendijk.de • www.tendijk.de

GEFAHR- UND SICHERHEITBESTIMMUNGEN:

H373 Kann die Organe (Blut) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt oder Mediziner anrufen.

P308+313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen.

P501 Inhalt/Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen



ACHTUNG

Vor dem Gebrauch Etikett, Merkblatt sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren. Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist auszuschließen. Bei Gebrauch des Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch Hände und Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen. Nagetiere können Krankheiten übertragen (z.B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren. Bei der Handhabung des Produktes und der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen (z.B. HYGOSTAR® NITRIL PROFESSIONAL 0,4 mm stark, aus Nitril, AQL 1,5.) oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden. Nach der Bekämpfung sofort Hände waschen, kontaminierte Kleidung wechseln und vor dem erneuten Tragen waschen. Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z.B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserleitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. Der Köder ist gefährlich für Wildtiere.

ERSTE-HILFE-MAßNAHME:

Achtung Rodentizid! Verschlucken kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen. Dieses Produkt enthält einen gerinnungshemmenden Stoff (Antikoagulant). Bei Verzeh können folgende Symptome auftreten, auch verspätet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. In schweren Fällen kann es zu Blutergüssen (Hämatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen. BEI HAUTKONTAKT: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen. BEI AUGENKONTAKT: die Augen mit Augenspülung oder Wasser ausspülen und die Augenlider mindestens 10 Minuten offen halten. BEI VERSCHLUCKEN: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Verzeh durch ein Haustier einen Tierarzt aufsuchen. Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem/tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden darf. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Medizinische Notfalloankunft bei Vergiftungen:

Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung 24/7 in deutscher oder englischer Sprache)

Zulassungsinhaber:
Detia Freyberg GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
D-69514 Laudenbach
Tel: +49(0)6201-708 0

917219

Inhalt: 5 kg

Mind. haltbar: siehe Aufdruck
Ch.-B.: siehe Aufdruck