

Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen. Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen. Anwendung durch sachkundige Verwender mit Sachkunde nach Anhang I Nr.3 Gefahrstoffverordnung, sowie weitere auf dem Merkblatt aufgelistete Verwender.

Anwendungsmethode: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind. Sachets mit dem Köder nicht öffnen!

ANWENDUNG:

Innenraum (Hausmäuse, Wanderratte):

Mäuse: Starker Befall: 40 g Köder pro Köderpunkt alle 2 m. Geringer Befall: bis zu 40 g Köder pro Köderpunkt alle 5 m.

Ratten: Starker Befall: bis 200 g Köder pro Köderpunkt alle 5 m. Geringer Befall: bis 200 g Köder pro Köderpunkt alle 10 m.

Permanentbeköderung /Dauerbeköderung nur unter strenge Auflage möglich (siehe Merkblatt) Nur in Bereichen (z.B. geschlossene Kabeltrassen oder Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltanlagen oder Hochspannungsschranken, Hohlräume in Wänden und Wandverkleidungen), die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstationen zulässig. Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird. Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

Außenbereich: um Gebäude (Hausmäuse, Wanderratte):

Mäuse: Starker Befall: 40 g Köder pro Köderpunkt alle 2 m. Geringer Befall: bis zu 40 g Köder pro Köderpunkt alle 5 m.

Ratten: Starker Befall: bis 200 g Köder pro Köderpunkt alle 5 m. Geringer Befall: bis 200 g Köder pro Köderpunkt alle 10 m.

Permanentbeköderung /Dauerbeköderung nur unter strenge Auflage möglich (siehe Merkblatt) Köder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schützen. Die Köder in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigt ist. Nur in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstationen zulässig. Dieses Produkt nicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbauten oder -löcher) einbringen. Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird. Das Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

Kanalisation (Wanderratte):

Bis zu 200 g pro Kanalisationsloch.

Gebrauchsfertiger Köder zur Befestigung im Kanalschacht oder Anwendung in Köderstationen, um zu verhindern, dass der Köder in Kontakt mit Abwasser kommt. Die Köder müssen so angewendet werden, dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen und nicht weggespült werden. Köderstellen in der Kanalisation müssen erstmalig nach 14 Tagen und anschließend alle 2 - 3 Wochen kontrolliert werden. Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen. Das Produkt nicht zur Permanentbeköderung (befallsunabhängigen Dauerbeköderung) oder Pulsbeköderung verwenden.

Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflussbereiches erfolgt, übernehmen wir eine Haftung nur für einwandfreie Qualität zum Tag der Lieferung.

TDS Difenacoum Pasta 50

**Gebrauchsfertiger Pastenköder zur sicheren
Bekämpfung von Wanderratten und Mäuse in der
Innenraumanwendung sowie im Außenbereich
(um Gebäude) und von Ratten in der Kanalisation.**

Wirkstoff: 0,05 g/kg (0,005%) Difenacoum
mit Bitterstoff, Farbstoff und Aroma
CAS Nummer: 56073-07-5
Biozid-Zulassungs-Nr.: DE-0000450-14



ten Dijk
Schädlingsbekämpfung

ten Dijk Schädlingsbekämpfung GmbH • Friedhofsweg 3a • D-49843 Uelsen
Tel.: +49(0)5948/998 300 2 oder +31(0)571/291 376 • info@tendijk.de • www.tendijk.de

SICHERHEITSHINWEISE:

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer
oder wiederholter Exposition. Vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch
alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Schutzhandschuhe tragen.
BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Unter Verschluss aufbewahren.
Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften zu führen.



GEFAHR

Aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit wirken gerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulantien) 4 bis 10 Tage nach der Aufnahme. Nagetiere können Krankheiten übertragen (z.B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Dieses Produkt enthält einen gerinnungshemmenden Stoff (Antikoagulans). Bei Verzehre können folgende Symptome auftreten, auch verspätet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. In schweren Fällen kann es zu Blutergüssen (Hämatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen. Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem/tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden darf. Im Falle von: Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen; Exposition der Augen: die Augen mit Augenspülung oder Wasser ausspülen und die Augenlider mindestens 10 Minuten offen halten; Orale Exposition: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Verzehr durch ein Haustier einen Tierarzt aufsuchen.

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz -
Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung 24/7 in deutscher oder englischer Sprache);
allgemeiner Notruf: 112

HINWEISE ZUR SICHEREN ENTSORGUNG DES PRODUKTS UND SEINER VERPACKUNG:

Nach Abschluss der Beköderung alle nicht angenommenen Köder und die Verpackung gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden.

LAGERUNG: An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Die Verpackung verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Hersteller und Zulassungsinhaber:

Unichem d.o.o.
Sinja Gorica 2
1360 Vrhnika, Slowenien
Tel.: +386 1 75 58 152
unichem@unichem.si
www.unichem.si

917209

Inhalt: 5 kg

Mind. haltbar: siehe Aufdruck
Ch.-B.: siehe Aufdruck