

BRODITOP® PASTA

Gebrauchsfertiger Pastenköder zur Ratten- und Mäusebekämpfung NUR FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

Nur wie im Etikett beschrieben zu gebrauchen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

WIRKSTOFF:

Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0) 0,05 g/kg (= 0,005%)

SICHERHEITSSÄTZE - S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren - S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten - S20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen - S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen - S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

WIRKungsweise und VERWENDUNG - BRODITOP® PASTA ist ein gebrauchsfertiger Köder zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten, der auch nach einmaliger Aufnahme wirksam ist. Der Tod von Nagern erfolgt nach wenigen Tagen (3-5) nach der Aufnahme, ohne dass ein Verdacht für die anderen Nager in der Kolonie entsteht.

BRODITOP® PASTA enthält Denatoniumbenzoat als Bitterstoff, um zu helfen, die unbeabsichtigte Einnahme durch Menschen zu verhindern. BRODITOP® PASTA enthält eine ausgewogene, für Nager attraktive, Mischung von Zutaten und ist geeignet für Ratten- und Mäusebekämpfungen in und um Gebäuden, wie beispielsweise Wohngebäuden, Krankenhäuser, Tierhaltung, Lebensmittel-Industrie, Kanalisationen, usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG - Für eine angemessene Nagerbekämpfung beachten Sie die folgende Vorgehensweise:
1. Standortaufnahme - Bevor der Köder ausgelegt wird, ist eine Standortaufnahme durchzuführen, um Art (d.h. Nagetier-Arten), Niveau und Ausmaß des Befalls festzustellen. Eventuelle Zugänge für Nager, wie Löcher und versteckte Plätze prüfen und alle Quellen von Wasser und Nahrung beseitigen; die am besten geeigneten Orte finden, wo der Köder ausgelegt werden kann - z.B. neben frischem Kot, innerhalb oder in der Nähe von Löchern, Durchgängen und Nahrungsquellen. Die präventive Anwendung von giftfreien Ködern ist ratsam, um die Anwendung von Rodentizid-Ködern zu minimieren, insbesondere bei der Nagerbekämpfung in sensiblen Bereichen (Nahrungsmittelindustrie, Getreidespeicher und Viehzucht).

BRODITOP®

Paste mit BRODIFACOUM

BRODIFACOUM 0,005%



XXXXX

2. Behandlung - Mit Hilfe von Schutzhandschuhen, Köder in manipulationssichere Köderboxen auslegen und dabei klare Hinweise über Inhalt und Zweck angeben. Falls diese nicht verfügbar sind, Köder in Drainagerohre oder unter Dachziegeln, Schindeln oder Wellblechen verstecken. Immer beachten, dass Köder von Kindern und Nichtziel-Tieren (z.B. Haustiere und Vögel) unerreikbaar sind.

Empfohlene Aufwandmengen

Mäusebefall: 50 g pro Köderstelle im Abstand von 5 Metern auslegen - bei starkem Befall im Abstand von 2 Metern;
Rattenbefall: 100 g pro Köderstelle im Abstand von 10 Metern auslegen - bei starkem Befall im Abstand von 5 Metern. Für Anwendung in Kanalisationen: bis zu 200 g pro Köderstellen auslegen.

3. Überwachung - Regelmäßig (alle 3 oder 4 Tage) Köderstellen kontrollieren und mit Hilfe von Schutzhandschuhen, alle Köder, die von Nagern gefressen oder durch Wasser und Schmutz beschädigt wurden, ersetzen. Die Stellen der ungenutzten Köder ändern.

4. Abschluss der Maßnahme - Die Behandlung ist erledigt, wenn Köder ungenutzt bleiben. Die übrig gebliebenen Köder und die toten Nager suchen, entfernen und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften für die Abfallbeseitigung sicher entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts

Behälter dicht verschließen und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken in Kontakt bringen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut mit viel Seife und Wasser abwaschen. Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach Arbeitsende waschen. Köder müssen sicher ausgelegt

werden und immer unzugänglich für Kinder, Haus- und Nichtziel-Tiere sein, um das Risiko einer versehentlichen Aufnahme zu reduzieren. Bei der Verwendung manipulationssicherer Köderboxen deutlich kennzeichnen, dass diese Rodentizide enthalten und diese nicht berührt werden dürfen. Behandelte Bereiche während der Behandlung immer deutlich kennzeichnen. Alle toten Nager in regelmäßigen Abständen während der Behandlung suchen und entfernen, mindestens so oft wie bei der Köder Überprüfung und/oder Ergänzung (manchmal kann eine tägliche Überprüfung nötig sein). Alle toten Nager gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Alle Köder nach der Behandlung entfernen und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Verpackung nicht wiederverwenden. Verpackung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Keine antikoagulant Rodentizide als ständige Köder verwenden. Einsätze sind von professionellen Schädlingsbekämpfern oder sachkundigen Personen zu beaufsichtigen. Meistens, ist die Behandlung nach 35 Tagen abgeschlossen. In jenen Bereichen, in denen Anzeichen von Resistenz gegenüber gewissen Wirkstoffen im Verdacht stehen, vermeiden Sie deren Anwendung. Um die Verbreitung von Resistenzen zu vermeiden und zu unterbinden, ist es ratsam Köder mit verschiedenen Antikoagulantien (Wirkstoffen) zu verwenden.

HINWEISE FÜR DEN ARZT - Anzeichen einer Vergiftung mit BRODIFACOUM ergeben sich aus einer erhöhten Blutungsneigung und umfassen eine Zunahme der Prothrombinzeit, leicht blaue Flecken, Blut im Stuhl oder Urin und allgemeine Schwäche. Schwerere Fälle von Vergiftungen sind Blutungen und ein Schockzustand. Wenn eine Vergiftung vermutet wird, sofort ärztlichen Rat einholen und die Verpackung und/oder das Etikett vorzeigen. BRODIFACOUM ist ein indirektes Antikoagulant. Phytomenadion (Vitamin K1) ist das Gegenmittel. Prothrombinwerte in nicht weniger als achtzehn Stunden nach Einnahme messen. Wenn diese erhöht sind, Vitamin K1 verabreichen bis zur Normalisierung. Die Bestimmung der Prothrombinwerte zwei Wochen nach Absetzen des Gegenmittels erneut durchführen; wenn diese noch hoch sind, Behandlung wiederaufnehmen.

BAu N. N-24298

(ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve - PD - Italien).

**HARZELI: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD) Italien - Tel.: +39 049 9597785**

www.zapiexpert.de - info@zapiexpert.de

Chargennummer und Produktionsdatum:

Verfallsdatum: 2 Jahre ab Produktionsdatum.

© Zapi S.p.A.

Inhalt: **300g**